

【大腸がん】

(2025年4月更新)

レジメン名	一般名	投与量	投与方法	投与日	1コース
FOLFIRI療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Bev+FOLFIRI療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Bev+mFOLFOX6療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
sLV5FU2療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	14日
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Bev+sLV5FU2療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Cmab+FOLFIRI療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	d1、8	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Cmab+mFOLFOX6療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	d1、8	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Cmab+CPT-11療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	d1、8、15、22、29、36、43	49日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1、15、29	
Cmab療法	セツキシマブ	400mg/m ² →250mg/m ²	点滴	d1	7日
CapeOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	d1	21日
	カベシタビン	2000mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
Bev+CapeOX療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	d1	
	カベシタビン	2000mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
IRIS療法	イリノテカン	125mg/m ²	点滴	d1、15	28日
	テガフル/ギメラシル/亜テラシル	80mg/m ²	経口	d1タ～15朝	

Pmab+FOLFIRI療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Pmab+mFOLFOX6療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Pmab療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	d1	14日
Bev+IRIS療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	d1	21日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	テガフル/ギメラシル/亜テラシル	80mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
SOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	d1	21日
	テガフル/ギメラシル/亜テラシル	80mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
Bev+SOX療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	d1	
	テガフル/ギメラシル/亜テラシル	80mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
Pmab+CPT-11療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
RAM+FOLFIRI療法	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Bev+Cape療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	d1	21日
	カベシタピン	2000mg/m ²	経口	d1タ～15朝	
Aflibercept+FOLFIRI療法	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴	d1	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	d1	
Bev+TAS-102療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	d1、15	28日
	トリフルリジンチピラシル	70mg/m ²	経口	d1タ～6朝、d8タ～13朝	