

化学療法プロトコール

申請日： 令和 6年9月20日

申請医師： 畑中 智貴

診療科： 外科

癌腫： 乳がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C401210	レジメン名：【初回】フェスゴ皮下注IN+DTX療法
1コース期間	3週	総コース数

備考：

・術前・術後療法の場合には、投与期間は12か月(最大18サイクル)まで・HER2陽性(IHC3+またはFISH陽性)確認・HER2陽性早期乳癌:投与前LVEF \geq 55%(化学療法にアントサイクリン系薬剤を含む場合は、その投与終了後のLVEF \geq 50%)確認・HER2陽性転移・再発乳癌:投与前LVEF \geq 50% 確認・初回投与時infusion reactionに注意。・投与中の過敏症反応の有無を確認。・投与後のドセタキセルによる浮腫に注意(ステロイドが有効)。・ドセタキセルは、6コース以上継続し、その後は主治医判断で継続とする。・Grade3以上の好中球減少やGrade4の血小板減少、Grade3以上の非血液毒性出現時、ドセタキセルを55mg/m²に減量する。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	フェスゴ IN	1 瓶/body	1 瓶/body	自動	皮下注射	day1
2	ドセタキセル	75 mg/m ²		自動	点滴	day1

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 皮下注射 フェスゴ IN 1 瓶/body ★バイアルの副片ラベルをシリンジに貼付 ★注射針 25G~27G ★8分以上かけて大腿部に皮下投与 ★初回投与後は30分経過観察</p> <p><2> 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><3> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆15分で点滴</p> <p><4> 点滴 ドセタキセル(アルコールフリー製剤) 75 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	
--	--