

化学療法プロトコール

申請日： 平成 27年2月5日

申請医師： 遠野 千尋

診療科： 外科

癌腫： 乳がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C040030	レジメン名： PTX(weekly)+Bev療法
1コース期間	4週	総コース数

備考：

・0.22 μ m以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与(DEHPフリー)。・患者のアルコール過敏の有無を確認(パクリタキセル)。・投与中の過敏症反応の有無を確認。・2コース目以降の神経障害の評価をする。・ベバシズマブ投与初回の投与時反応に注意。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パクリタキセル	90 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	ベバシズマブ	10 mg/kg		自動	点滴	day1, day15

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 ファミジン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL> ◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 90 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p><4> 点滴 ベバシズマブ 10 mg/kg セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆初回90分・2回目60分・以降30分で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 ファミジン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL> ◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 90 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 ファミジン静注20mg20mL「日新」(カスター) 1 A ホラミン注5mg(1mL) 1 A セシヨク(生食) <50mL> ◆ 1 瓶 ☆30分で点滴</p>	<p><3> 点滴 パクリタキセル 90 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆60分で点滴 ★フィルター付点滴セットにて投与</p> <p><4> 点滴 ベバシズマブ 10 mg/kg セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆初回90分・2回目60分・以降30分で点滴</p>
--	---