

化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年11月7日 申請医師： 遠野 千尋
診療科： 外科 癌腫： 乳がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C040040	レジメン名： TC療法
1コース期間	3週	総コース数

備考：
・術前・術後補助療法の場合は4コース。・間質性肺炎または肺線維症の有無の確認。・ドセタキセルは起壊死性抗がん剤なので血管外漏出注意。・投与中の過敏症反応の有無を確認。・投与後のドセタキセルによる浮腫に注意(ステロイドが有効)。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ドセタキセル	75 mg/m ²		自動	点滴	day1
2	エンドキサン(シクロホスファミド)	600 mg/m ²		自動	点滴	day1

備考：
ケモセーフ使用時、DTX(アルコールフリー製剤)は粘度が高いため、シリンジ内で希釈混和し混注すること

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 デ[®]カド[®]錠4mg 2 錠 朝1錠、昼1錠 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 <input type="checkbox"/> 外来 化学療法実施 〈1〉 点滴 セ[®]イ[®]ヨ[®](生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 【H】 【6.6mg】 デ[®]キ[®]サ[®]ト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 【H】 デ[®]キ[®]サ[®]ト注射液 3.3mg/1mL 1 A ケ[®]ラ[®]セ[®]ト[®]ン点滴静注パ[®]ツ[®]ク[®] 3mg/50mL「HK」 1 袋 ☆15分で点滴 〈3〉 点滴 ドセタキセル(アルコールフリー製剤) 75 mg/m² 生理食塩液 250mL 1 袋 ★ケモセーフ使用時、シリンジ内希釈混和法で調整 ☆60分で点滴 〈4〉 点滴 エンドキサン (シクロホスファミド) 600 mg/m² セ[®]イ[®]ヨ[®](生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	
--	--