

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規
診療科： 外科 癌腫： 胃がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C020020	レジメン名： TS-1+CDDP療法(TS-1:120mg)
1コース期間	5週	総コース数

備考：
TS-1投与基準：BSA<1.25㎡…40mg/回 1.25㎡≤BSA<1.5㎡…50mg/回 1.5㎡≤BSA…60mg/回
CDDP：腎障害時の投与変更例 Ccr 60~46(25%減量) 45~31(50%減量) 30≥(使用中)

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	シスプラチン	25 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	ティーエスワン	120 mg/body		自動	内服	day1~day21

備考：

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉テカトロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日から 朝 昼 食後30分 3日 〈内服〉 臨時 ティーエスワン 120 mg/body 朝 夕 食後30分 21日 注射 〈1〉 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈3〉 点滴 ハロベトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイ村」 1袋 アカリ点点滴静注235mg/10mL 1瓶 【H】 【6.6mg】 テキート注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキート注射液 3.3mg/1mL 1A ★30分で点滴 〈4〉 点滴 硫酸Mg補正液2.46g/20mL 0.4管 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈5〉 点滴 アセト注20mg「NIG」(ラジックス) 1A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ★15分で点滴 〈6〉 点滴 シスプラチン 25 mg/m² セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★全量500mLに調製：シスプラチン使用量分の生食を抜去 ★2時間で点滴 〈7〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈8〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day8 処方</p>	<p>〈内服〉 臨時 〈4mg〉テカトロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日から 朝 昼 食後30分 3日 注射 〈1〉 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈3〉 点滴 ハロベトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイ村」 1袋 アカリ点点滴静注235mg/10mL 1瓶 【H】 【6.6mg】 テキート注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキート注射液 3.3mg/1mL 1A ★30分で点滴 〈4〉 点滴 硫酸Mg補正液2.46g/20mL 0.4管 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈5〉 点滴 アセト注20mg「NIG」(ラジックス) 1A セシヨク(生食) <50mL>◆ 1瓶 ★15分で点滴 〈6〉 点滴 シスプラチン 25 mg/m² セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★全量500mLに調製：シスプラチン使用量分の生食を抜去 ★2時間で点滴 〈7〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 〈8〉 点滴 セシヨク(生食) 《500mL》 1袋 ★2時間で点滴 予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day15 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉テカトロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日から 朝 昼 食後30分 3日</p>
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 胃がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C020020	レジメン名： TS-1+CDDP療法(TS-1:120mg)
------	---------	--------------------------------

注射

- <1> 点滴
セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶
☆プライミング・ウォッシュアウト用
- <2> 点滴
セリョク(生食) 《500mL》 1 袋
☆2時間で点滴
- <3> 点滴
パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイク」 1 袋
7カリル点滴静注235mg/10mL 1 瓶
【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶
【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A
☆30分で点滴
- <4> 点滴
硫酸Mg補正液2.46g/20mL 0.4 管
セリョク(生食) 《500mL》 1 袋
☆2時間で点滴
- <5> 点滴
7ロミド注20mg「NIG」 (ラシックス) 1 A
セリョク(生食) <50mL>◆ 1 瓶
☆15分で点滴
- <6> 点滴
シスプラチン 25 mg/m²
セリョク(生食) 《500mL》 1 袋
★全量500mLに調製：シスプラチン使用量分の生食を抜去
☆2時間で点滴
- <7> 点滴
セリョク(生食) 《500mL》 1 袋
☆2時間で点滴
- <8> 点滴
セリョク(生食) 《500mL》 1 袋
☆2時間で点滴

予約

施設予約 外科 時間指定なし
化学療法 外来化学療法