

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規  
診療科： 外科 癌腫： 胃がん  
実施区分： 入外共通

管理番号	C031501	レジメン名： ニボルマブ+CapeOX療法(末梢用)(Cape:4200mg)
1コース期間	3週	総コース数

**備考：**

カペシタビン: 1日2回投与 14日間内服のち7日間休薬  
 カペシタビン: BSA<1.36㎡:1200mg/回 1.36㎡≤BSA≤1.66㎡:1500mg/回 1.66㎡≤BSA≤1.96㎡:1800mg/回  
 1.96㎡≤BSA:2100mg/回  
 オプジーボ: 間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オプジーボ	360 mg/body		自動	点滴	day1
2	オキサリプラチン	130 mg/㎡		自動	点滴	day1
3	カペシタビン	4200 mg/body		自動	内服	day1～day14

**備考：**

カペシタビン: BSA<1.36㎡:1200mg/回 1.36㎡≤BSA≤1.66㎡:1500mg/回 1.66㎡≤BSA≤1.96㎡:1800mg/回  
 1.96㎡≤BSA:2100mg/回

**実施内容**

<p>day1                  処方                  &lt;内服&gt; 臨時                  &lt;4mg&gt; デキサトロン錠4mg 2錠                  朝1錠、昼1錠                  ★化学療法翌日より服用                  朝 昼 食後30分 2日                  &lt;内服&gt; 臨時                  カペシタビン 4200 mg/body                  朝 夕 食後30分 14日                  &lt;外用&gt; 臨時                  ハリゾン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本)(ヒルドイドソフト軟膏)                  50g                  1日2回 手、足                  注射                  &lt;1&gt; 点滴                  セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                  ☆プライミング・ウォッシュアウト用                  &lt;2&gt; 点滴                  オプジーボ 360 mg/body                  セイヨク(生食) &lt;50mL&gt; ◆ 1瓶                  ☆30分で点滴                  ★0.2μmインラインフィルターを使用                  &lt;3&gt; 点滴                  クラニセトロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1袋                  【H】 【6.6mg】 デキサトロン注射液 6.6mg/2mL 1瓶                  ☆30分で点滴                  &lt;4&gt; 点滴                  オキサリプラチン 130 mg/㎡                  【H】 デキサトロン注射液 3.3mg/1mL 1A                  フドウ糖注 5% &lt;&lt;500mL&gt;&gt; 1袋                  ☆2時間で点滴</p>	
---	--