

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日 申請医師： 箱崎 将規  
 診療科： 外科 癌腫： 胃がん  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C031400	レジメン名： ニボルマブ+SOX療法(CVポート用)(TS-1:120mg)
1コース期間	3週	総コース数

備考：

エスワン:1日2回投与 14日間内服のうち7日間休薬  
 エスワン:BSA<1.25㎡:40mg/回 1.25㎡≤BSA≤1.5㎡:50mg/回 1.5㎡≤BSA:60mg/回  
 オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オプジーボ	360 mg/body		自動	点滴	day1
2	オキサリプラチン	130 mg/㎡		自動	点滴	day1
3	ティーエスワン	120 mg/body		自動	内服	day1～day14

備考：

エスワン:BSA<1.25㎡:40mg/回 1.25㎡≤BSA≤1.5㎡:50mg/回 1.5㎡≤BSA:60mg/回  
 オプジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

実施内容

<p>day1                  処方                  &lt;内服&gt; 臨時                  &lt;4mg&gt; テキサドロン錠4mg 2錠                  朝1錠、昼1錠                  ★化学療法翌日より服用                  朝 昼 食後30分 2日                  &lt;内服&gt; 臨時                  ティーエスワン 120 mg/body                  朝 夕 食後30分 14日</p> <p>注射                  &lt;1&gt; 点滴                  セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                  ☆プライミング・ウォッシュアウト用                  &lt;2&gt; 点滴                  オプジーボ 360 mg/body                  セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1瓶                  ☆30分で点滴                  ★0.2μmインラインフィルターを使用                  &lt;3&gt; 点滴                  ケラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HKJ」 1袋                  【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶                  ☆30分で点滴                  &lt;4&gt; 点滴                  オキサリプラチン 130 mg/㎡                  ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋                  ☆2時間で点滴</p>	
--	--