

# 化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年7月1日 申請医師： 箱崎 将規  
診療科： 外科 癌腫： 胃がん  
実施区分： 入外共通

|        |         |                                 |
|--------|---------|---------------------------------|
| 管理番号   | C031600 | レジメン名： ニボルマブ+mFOLFOX6療法(HER2陰性) |
| 1コース期間 | 2週      | 総コース数                           |

備考：  
オブジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

| 番号 | 薬剤名      | 基準投与量                  | 投与量上限 | 規格 | 投与方法 | 投与スケジュール(day1等) |
|----|----------|------------------------|-------|----|------|-----------------|
| 1  | オブジーボ    | 240 mg/body            |       | 自動 | 点滴   | day1            |
| 2  | レボホリナート  | 200 mg/m <sup>2</sup>  |       | 自動 | 点滴   | day1            |
| 3  | オキサリプラチン | 85 mg/m <sup>2</sup>   |       | 自動 | 点滴   | day1            |
| 4  | フルオロウラシル | 400 mg/m <sup>2</sup>  |       | 自動 | 点滴   | day1            |
| 5  | フルオロウラシル | 2400 mg/m <sup>2</sup> |       | 自動 | 点滴   | day1            |

備考：  
オブジーボ:間質性肺炎、1型糖尿病など重篤な副作用発現の可能性あり要経過観察。また、HER2陰性であることを確認すること。

## 実施内容

|  |  |
|--|--|
| <p>day1<br/>処方<br/>〈内服〉 臨時<br/>〈4mg〉 テキサドロン錠4mg 2錠<br/>朝1錠、昼1錠<br/>★化学療法翌日より服用<br/>朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射<br/>〈1〉 点滴<br/>セトロン(生食) 【100mL】 ●● 1瓶<br/>☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>〈2〉 点滴<br/>オブジーボ 240 mg/body<br/>セトロン(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1瓶<br/>☆30分で点滴<br/>★0.2μmインラインフィルターを使用</p> <p>〈3〉 点滴<br/>グレースロン点滴静注パック 3mg/50mL【HK】 1袋<br/>【H】 【6.6mg】 テキサド注射液 6.6mg/2mL 1瓶<br/>☆30分で点滴</p> <p>〈4〉 点滴<br/>オキサリプラチン 85 mg/m<sup>2</sup><br/>ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋<br/>☆2時間で点滴</p> <p>〈5〉 点滴<br/>レボホリナート 200 mg/m<sup>2</sup><br/>ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋<br/>★オキサリプラチンと同時に2時間で点滴</p> <p>〈6〉 点滴<br/>フルオロウラシル 400 mg/m<sup>2</sup><br/>セトロン(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1瓶<br/>★10分で点滴</p> <p>〈7〉 点滴<br/>フルオロウラシル 2400 mg/m<sup>2</sup><br/>セトロン(生食) 【100mL】 ●● 1瓶<br/>☆全量100mLに調整<br/>☆46時間・シュアーフューザー</p> <p>〈8〉 静注<br/>生食注【シリンジ】 オツカ20mL◆ 1本</p> |  |
|--|--|