

# 化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年11月26日 申請医師： 遠野 千尋  
 診療科： 外科 癌腫： 大腸がん  
 実施区分： 入外共通

管理番号	C030070	レジメン名： Cmab+mFOLFOX6(初回～セツキシマブ2回目：day14まで)
1コース期間	2週	総コース数

備考：  
 ・セツキシマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)は初回投与中、または投与後1時間以内に発現するので投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・低Mg血症、電解質異常に注意。・皮膚障害対策として、ミノマイシン、保湿剤などを処方する。・オキサリプラチンによる急性の神経障害は投与後数日間に出現しやすい。また、遅発性の末梢神経障害は用量依存性である。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アービタックス(セツキシマブ)	400 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
2	アービタックス(セツキシマブ)	250 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day8
3	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
4	レポホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
5	5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1
6	5-FU	2400 mg/m <sup>2</sup>		自動	点滴	day1

備考：

## 実施内容

<p>day1                      処方                      &lt;内服&gt; 臨時                      &lt;4mg&gt; テキサドロン錠4mg 2錠                      朝1錠、昼1錠                      ★化学療法翌日より服用                      朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                      ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴                      グラセロン点滴静注パック 3mg/50mL [HK] 1袋                      [H] 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶                      [H] テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A                      ホラミン注5mg(1mL) 1A                      ☆15分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴                      アービタックス(セツキシマブ) 400 mg/m<sup>2</sup>                      セイヨク(生食) 《500mL》 1袋                      ☆2時間で点滴                      ★全量500mLに調整：アービタックス使用分の生食を抜</p> <p>去                      &lt;4&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                      ☆60分で点滴</p> <p>&lt;5&gt; 点滴                      オキサリプラチン 85 mg/m<sup>2</sup>                      ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋                      ☆2時間で点滴</p> <p>&lt;6&gt; 点滴                      レポホリナート 200 mg/m<sup>2</sup>                      ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋                      ★&lt;オキサリプラチン&gt;と同時に2時間で点滴</p> <p>&lt;7&gt; 点滴                      フルオロウラシル 400 mg/m<sup>2</sup>                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1瓶                      ★10分で点滴</p> <p>&lt;8&gt; 点滴                      フルオロウラシル 2400 mg/m<sup>2</sup>                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                      ☆全量1000mLに調整                      ☆46時間・シユアーフェューザー</p>	<p>&lt;9&gt; 静注                      生食注【シツジ】 オーク20mL◆ 1本                      ☆ポートフラッシュ用</p> <p>予約                      施設予約 外科 時間指定なし                      化学療法 外来化学療法</p> <p>day8                      注射                      &lt;1&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                      ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>&lt;2&gt; 点滴                      [H] 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶                      ホラミン注5mg(1mL) 1A                      セイヨク(生食) &lt;50mL&gt;◆ 1瓶                      ☆15分で点滴</p> <p>&lt;3&gt; 点滴                      アービタックス(セツキシマブ) 250 mg/m<sup>2</sup>                      生理食塩液 250mL 1袋                      ★全量250mLに調整：アービタックス使用分の生食を抜</p> <p>去                      ☆60分で点滴</p> <p>&lt;4&gt; 点滴                      セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶                      ☆60分で点滴</p> <p>予約                      施設予約 外科 時間指定なし                      化学療法 外来化学療法</p>
--	--