

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月19日 申請医師： 箱崎 将規
診療科： 外科 癌腫： 大腸がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C030010	レジメン名： FOLFIRI
1コース期間	2週	総コース数

備考：
・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	イリノテカン	150 mg/m ²		自動	点滴	day1
2	レボホリナート	200 mg/m ²		自動	点滴	day1
3	5-FU	400 mg/m ²		自動	点滴	day1
4	5-FU	2400 mg/m ²		自動	インフューザーポンプ 46時間 5ml/h	day1

備考：

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 デキストロン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 □外来 化学療法実施 〈1〉 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイプ」 1袋 【H】 【6.6mg】 デキスト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキスト注射液 3.3mg/1mL 1A ★15分で点滴 〈3〉 点滴 イリノテカン 150 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ★90分で点滴 ★〈レボホリナート〉と同時に 〈4〉 点滴 レボホリナート 200 mg/m² 生理食塩液 250mL 1袋 ★2時間で点滴 ★〈イリノテカン〉と同時に 〈5〉 点滴 フルオロウラシル 400 mg/m² セイヨク(生食) <50mL> ◆ 1瓶 ★10分で点滴 〈6〉 抗悪性腫瘍剤持続注入 フルオロウラシル 2400 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★全量100mLに調整 ★46時間・シュアーフューザー 〈7〉 静注 生食注【シリンジ】 オーク20mL ◆ 1本 ★ポートフラッシュ用</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>	
--	--