

化学療法プロトコール

申請日： 令和 5年5月10日

申請医師： 箱崎 将規

診療科： 外科

癌腫： 大腸がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C030160	レジメン名： Pmab+mFOLFOX6
1コース期間	2週	総コース数

備考：

・インラインフィルター(0.2 μ m)を使用。・オキサリプラチンによる急性の神経障害は投与後数日間に出現しやすい。また、遅発性の末梢神経障害は用量依存性である。・オキサリプラチンによるアレルギー症状は初回投与時から出現しやすい。特に6コース以降注意。発現時間は投与30分以内が多い。・パニツムマブによる重度のinfusion reaction(気管支痙攣、低血圧、蕁麻疹、意識消失など)に備えて投与中、または投与終了後1時間はバイタルをモニターする。・皮膚障害対策として、ミマイシン、保湿剤などを処方する。・低Mg血症、電解質異常に注意。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ベクティビックス(パニツムマブ)	6 mg/kg		自動	点滴	day1
2	オキサリプラチン	85 mg/m ²		自動	点滴	day1
3	レボホリナート	200 mg/m ²		自動	点滴	day1
4	5-FU	400 mg/m ²		自動	点滴	day1
5	5-FU	2400 mg/m ²		自動	点滴	day1

備考：

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 デキサメタゾン錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 2日</p> <p>注射 □外来 化学療法実施 〈1〉 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p>〈2〉 点滴 ベクティビックス (パニツムマブ) 6 mg/kg セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆1時間で点滴 ★フィルター付き点滴セット使用</p> <p>〈3〉 点滴 ゲテトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL [HK] 1袋 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 デキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴</p> <p>〈4〉 点滴 オキサリプラチン 85 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴 ★〈レボホリナート〉と同時に</p> <p>〈5〉 点滴 レボホリナート 200 mg/m² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴 ★〈オキサリプラチン〉と同時に</p> <p>〈6〉 点滴 フルオロウラシル 400 mg/m² セイヨク(生食) <50mL> ◆ 1瓶 ★10分で点滴</p> <p>〈7〉 抗悪性腫瘍剤持続注入 フルオロウラシル 2400 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆全量1000mLに調整 ☆46時間・シューアーフューザー</p> <p>〈8〉 静注 生食注 【シリンジ】 オツク20mL ◆ 1本 ☆ポートフラッシュ用</p>	<p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>
---	--