

化学療法プロトコール

申請日： 平成 30年4月23日 申請医師： 石黒 保直
診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C050016	レジメン名： FOLFIRINOX療法
1コース期間	2週	総コース数

備考：
腸管麻痺・腸閉塞のある患者は禁忌です。持続した便秘・嘔吐等が認められる場合は腸管麻痺・腸閉塞がないか確認してください。
糖尿病の患者は慎重投与です。高度な下痢の持続により、脱水・電解質異常を起こして糖尿病が増悪し、致命的となるおそれがあります。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	オキサリプラチン	85 mg/m ²		自動	点滴	day1
2	イリノテカン	180 mg/m ²		自動	点滴	day1
3	レボホリナート	200 mg/m ²		自動	点滴	day1
4	フルオロウラシル	400 mg/m ²		自動	点滴	day1
5	フルオロウラシル	2400 mg/m ²		自動	インフューザーポンプ	day1

備考：

実施内容

実施内容	予約
day1 処方 <内服> 臨時 <4mg> テカト錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 ★化学療法翌日より服用 朝 昼 食後30分 3日 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 ハロセト点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイク」 1袋 アカリス点滴静注235mg/10mL 1瓶 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆30分で点滴 <3> 点滴 オキサリプラチン 85 mg/m ² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴 <4> 点滴 イリノテカン 180 mg/m ² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆90分で点滴 ★<レボホリナート>と同時に <5> 点滴 レボホリナート 200 mg/m ² ブドウ糖注 5%250mL **** 1袋 ☆2時間で点滴 ★<イリノテカン>と同時に <6> 点滴 フルオロウラシル 400 mg/m ² セイヨク(生食) <50mL> ◆ 1瓶 ☆10分で点滴 <7> 抗悪性腫瘍剤持続注入 フルオロウラシル 2400 mg/m ² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ☆全量100mLに調整 ☆46時間・シユアーフューザー <8> 静注 生食注【シラジ】 オツカ20mL ◆ 1本 ☆ポートフラッシュ用	施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法